La Tos Ferina (tos convulsiva o pertusis)

Información importante para padres de familia y cuidadores de niños

Hay un brote epidémico de pertusis el condado de Washtenaw: 233 casos de pertusis eran reportados en 2010 (comparado a 23 en 2008, y 84 en 2009).

Riesgo

—Pertusis es una enfermedad muy contagiosa que afecta a la vía respiratoria.
—Los bebés corren el mayor peligro de contraerlo gravemente por no estar completamente vacunados todavía (con DTaP), y porque sus sistemas respiratorios siguen en desarrollo.
—Muchos bebes que contraen la pertusis necesitan ser hospitalizados.
—Pertusis puede causar tos y problemas de respiración en jóvenes y adultos.

¡Vacúnese a usted y a su familia!

—La vacuna contra pertusis es muy importante para los padres nuevos y cualquier persona que vaya a ver o a cuidar a un bebe. ¡Rodee los bebes con protección! Muchas veces la pertusis es transmitída a un bebe por otra persona que tiene la tos ferina o pertusis sin saberlo.
—Confirmar que sus niños han recibido sus vacunas contra la pertusis.
—Los niños de 10 años o más y adultos necesitan una vacuna de refuerzo (un "booster"). La vacuna de "Tdap" es para todas las personas entre 10 y 64 años.
—Vacunas son disponibles en el departamento de salud del condado, o en la oficia de su médico.

Síntomas

—Síntomas de pertusis son fiebre de bajo grado, nariz que moquea y tos que es peor después de una semana o dos. Es posible que la tos dure un mes o más.
—Muchas veces, jóvenes, adultos o bebes pequeños no hacen el sonido clásico, o "el whoop" cuando tosen.
—Llame a su médico en los siguientes casos: tos fuerte o convulsa, vómito después de toser, dificultad de respirar o cualquier tos que dura más que dos semanas o se parece fuera de lo normal.

Tratamiento

—El tratamiento de pertusis es con antibióticos.
—La personas que toman antibióticos para pertusis debe quedarse en casa por 5 días, especialmente si la persona ha tenido síntomas por menos que 3 semanas.
—Los antibióticos son recomendados para otras personas que viven en la misa casa con la persona que tiene la tos ferina, para prevenir otras cosos.

Departamento de salud del condado de Washtenaw
555 Towner St. Ypsilanti, MI 48198
734-544-6700
http:\\publichealth.ewashtenaw.org

WASHTENAW COUNTY PUBLIC HEALTH
... focused on prevention